

Mezei nyúl

(*Lepus europaeus*)

Tudta-e?

..., hogy az üregi nyúltól karcsúbb és nyújtottabb feje, nagyobb termete, hosszabb füle és eltérő színű farka vagy „bokkrétája” alapján különíthető el. Eltérnek még az udvarlási szokásaik is, valamint a mezei nyúl utódait a szabadban hozza a világra egy vájt kis mélyedésben, és nem egy földalatti üregben; továbbá már röviddel születésük után látnak és el is tudnak futni. Abban azonban hasonlóságot mutat a két faj, hogy szinte teljes körben látnak, hiszen ily módon szemmel tudják tartani üldözőjük mozgását.

..., hogy kisebb-nagyobb vándorutakat is megtesz.

..., hogy az ivarok sem a szőr színezete, sem testtömeg alapján nem különböztethetők meg egymástól.

..., hogy erős hátsó lábai segítségével a 70 kilométer/órás sebességet is képes elérni.

..., hogy az újszülött nyúl 4 metszőfoga állandó, a többi tejfog. A nyúlalakúak felső állkapcsában a két metszőfog mögött egy második pár - támasztófog - is található.

..., hogy vakbelének térfogata többszöröse a gyomor térfogatának, ahol olyan baktériumok élnek, amelyek képesek a cellulóz lebontására.

..., hogy nem rendelkeznek izzadságmirigyekkel, ezért a hatalmas fülkagyló a test hőszabályozó funkcióját is ellátja.

..., hogy a faj legkorábbi leletei mintegy 200-300 ezer évesek, a Kárpát-medence faunájában jelenléte mintegy 11-12 ezer éve folyamatos. Régóta vadászott emlősfajként számos régészeti feltárás anyagából is előkerült. Vadászatát már IV. Béla 1265 évi oklevele is szabályozta.

..., hogy a ragadozó emlősök elleni védekezést szolgálja az a viselkedésformája, hogy egy szakaszon a pihenőhelyre menet saját nyomán visszafut, majd többméteres oldalugrással foglalja el a vackát. A szagnyomot követő ragadozók így mintegy "zsákutcába" kerülnek, az oldalról figyelő nyúlnak pedig több esélye marad a menekülésre.