

## **Szivárványos ökle** *(Rhodeus amarus)*

### **Tudta-e...?**

..., hogy a hím az ivás idején a szivárvány minden színében tündöklő nászruhát ölt.

..., hogy szaporodása, mely sokáig ismeretlen volt a tudomány számára a festőkagyló, vagy tavi kagyló jelenlétéhez kötött. A nőstény a tojócső „beostorozása” által egyesével bocsátja nagyméretű ikráit a kagyló kopoltyúinak tövén elhúzódó járatba, amelyek a kagyló összehúzódása következtében azután a kopoltyúba kerülnek. A tejes (hím) minden ikrát egyenként termékenyít meg. Az ikrás (nőstény) távozása után a kagyló fölé úszik, majd kibocsátja tejét, melyet a kagyló légző mozgása keltette vízáramlat juttat el az ikrához. A kikelt ivadékok a kagyló kopoltyúlemezei között maradnak a szikzacskó felszívódásáig, ezáltal teljes védelmet élvezve. A kagyló által folyamatosan cirkuláltatott víz egyben bőséges oxigénellátást is biztosít számukra.

..., hogy egyéb elnevezései: "keserűhal", "keserű ökle", "lapistyán", "ökle", "petikehal", "sároglya", "pohé", "Szent Péter hala".